



Nr. 1891/1.04.2015

CATRE

MEDICII DE FAMILIE
MEDICII SCOLARI

Având în vedere adresa Ministerului Sănătății nr. 20802 din 27 03 2015 înregistrată la DSP Cluj sub nr. 1891 din data de 1.04.2015 va comunicăm noua schemă de vaccinare cuprinsă în Calendarul Național de Vaccinare.

În noua schemă de vaccinare se vor utiliza 3 doze de vaccin hexavalent pentru vaccinarea copiilor cu vârsta de 2, 4 și 11 luni, vaccinarea cu vaccinul ROR la copiii cu vârsta de 12 luni, 5 ani precum și pentru vaccinarea copiilor cu vârsta de 7 ani în anul 2015, recuperarea cu vaccin VPI pentru copii cu vârsta de 6 și 8 ani la medicul de familie, precum și realizarea tuturor vaccinarilor din cadrul schemei naționale de vaccinare de către medicii de familie.

Astfel, începând cu data de 01.04.2015, noua schemă de vaccinare este următoarea:

VÂRSTA RECOMANDATĂ	TIPUL DE VACCINARE	COMENTARIU
Primele 24 de ore 2-7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B) Vaccin de tip Calmette Guerin (BCG)	În maternitate
2 luni ¹⁾	Vaccin hexavalent (dTPa-VPI-Hib-HepB) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	Medicul de familie
4 luni ¹⁾	Vaccin hexavalent (dTPa – VPI – Hib - HepB) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	Medicul de familie
11 luni ¹⁾	Vaccin hexavalent (dTPa – VPI – Hib - HepB) Vaccin pneumococic conjugat ¹⁾	Medicul de familie
12 luni	Vaccin rujeolic – rubeolic – oreion (ROR)	Medicul de familie
5 ani ²⁾ 7 ani ²⁾	Vaccin rujeolic – rubeolic – oreion (ROR)	Medicul de familie
6 ani ³⁾	Vaccin tetravalent diftero-tetano-pertussis acelular – poliomielitic (dTPa – VPI / VPI ³⁾)	Medicul de familie
8 ani ⁴⁾	Vaccin poliomielitic inactivat ⁴⁾ (VPI ⁴⁾)	Medicul de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetanic / Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular (dT / dTPa)	Medicul de familie

Notă: ¹⁾ Vaccinul pneumococic conjugat va fi introdus în calendarul de vaccinare în funcție de fondurile disponibile

²⁾ Se realizează inclusiv la copiii care împlinesc vârsta de 7 ani în anul 2015 și la copiii care împlinesc 7 ani în anul 2016

³⁾ Copiii cu vârsta de 6 ani

– Care au în antecedentele vaccinale o doză de dTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI

– Care nu au în antecedentele vaccinale o doză de dTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu dTPa – VPI

⁴⁾ Copiii cu vârsta de 8 ani care au în antecedentele vaccinale o doză de dTPa la 4 ani vor fi vaccinați cu VPI în 2015 (copiii care nu au fost școlarizați în clasa pregătitoare)

Se aplică numai în anul 2015.

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Mihai Moisescu-Goia